

## KULLANMA TALİMATI

### DİDERAL 40 mg tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Propranolol HCl 40 mg
- **Yardımcı maddeler:** Mannitol, aljinik asit, jelatin (sığır kaynaklı), ponceau 4-R, magnezyum stearat, stearik asit

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **DİDERAL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **DİDERAL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **DİDERAL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **DİDERAL'in saklanması**

### **Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. DİDERAL nedir ve ne için kullanılır?**

- DİDERAL tablet ağızdan alınır. İlacınızın bir kutusu içinde her biri 40 mg propranolol hidroklorür içeren 50 adet tablet bulunur.
- DİDERAL beta-blokörler adı verilen ilaç grubuna dahildir. DİDERAL etkisini, vücudunuzda doğal olarak bulunan, kalbinizi ve kan damarlarınızı etkileyen bazı kimyasal maddelerin (örneğin, epinefrin) etkilerini durdurarak gösterir. Bu etki kalp atım sayısının azalmasına, kan basıncının düşmesine ve kalbinizin zorlanmasının azalmasına yol açar.
- DİDERAL aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:
  - Önceden var olan bir böbrek hastalığı olmadan veya bilinen herhangi nedene bağlı olmayan yüksek tansiyon (esansiyel hipertansiyon) ve böbrek bozukluğuna bağlı yüksek tansiyonun kontrolü.
  - Kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısının (Anjina pectoris) tedavisi
  - Akut kalp krizi (miyokard infarktüsü) sonrasında uzun süreli koruma amacıyla
  - Kalp atım bozukluklarının (disritmi) çoğunda kontrol amacıyla
  - Migrenden korunmak için
  - Önceden var olan bir böbrek hastalığı olmadan veya bilinen herhangi neden bağlı olmayan titremenin (tremor) tedavisi

- Aşırı kaygı durumunu (anksiyete) ve kaygıya bağlı olarak kalp atımının hızlanmasını kontrol altına almak için
- Tiroid hormonlarının aşırı salgılanması (tirotoksikoz) ve buna bağlı kriz durumunun tedavisine yardımcı olarak
- Kalp kasının aşırı kalınlaşarak tıkaçıcı bir hal almasına neden olan hastalığın (Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati) tedavisinde
- Böbrek üstü bezinde oluşan bir tümörün yol açtığı, epinefrin/norepinefrin gibi maddelerin aşırı salgılandığı bir hastalık olan feokromositomanın tedavisinde (Bir alfa-blokörle birlikte)

## **2. DİDERAL 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **DİDERAL' i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer,

- Etkin madde olan propranolol hidroklorür veya bu ilaçtaki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
- Sizde kalp atım hızını yavaşlatan bazı bozukluklar varsa (bradikardi, ikinci derece kalp bloğu, üçüncü derece kalp bloğu veya hasta sinüs sendromu)
- Kan basıncınız düşükse,
- Ciddi kan dolaşımı problemleriniz varsa (bu durum, el ve ayak parmaklarınızın karıncalanmasına ya da solgunlaşmasına veya morarmasına neden olabilir)
- Diyabetiniz varsa (düşük kan şekeri değerinin baskılanmasına ve fark edilememesine neden olabilir.)
- KOAH (akciğerde uzun süreli hava yolları tıkanıklığı ile seyreden hastalık) hastalığınız varsa
- Kalbinizdeki ciddi bir bozukluk yüzünden oluşan baygınlık, bilinç kaybı varsa (kardiyojenik şok)
- Kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız varsa (kontrol edilmeyen kalp yetmezliği) ve yetmezlik propranolol ile tedavi edilebilen bir hızlı atımlı ritim bozukluğuna ikincil değilse,
- Bronşlarda daralmaya neden olan astım hastalığınız varsa veya bronşlarınızda spazm olması gibi bir durum yaşadığınız,
- Uzun süre aç kaldıysanız,
- Vücuttaki asit-baz dengenizi bozarak, kanda aşırı miktarda asit birikmesine neden olan bir bozukluğunuz (metabolik asidoz) varsa,
- İstirahat halindeyken göğsünüzde sıkışma ve ağrı hissediyorsanız (Prinzmetal angina)
- Tedavi edilmemiş feokromositoma hastalığınız (böbrek üstü bezi tümörüne bağlı yüksek kan basıncı) varsa.
- Açsanız veya yakın zamana kadar aç olmanız durumunda (hipoglisemi)

DİDERAL' i kullanmayınız.

### **DİDERAL' i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer,

- Ciddi alerjik reaksiyon öykünüz varsa,
- Kas zayıflığı (miyastenia gravis) hastalığınız varsa,
- Kan dolaşımı probleminiz varsa,
- Hipertiroidizm belirtileriniz (iştah artışı, kilo kaybı, terleme) varsa,
- Sedef hastalığınız veya sedef hastalığı öykünüz varsa,
- Sigara kullanıyorsanız,

- Kalp yetmezliği öykünüz varsa ve durumunuz ilaçlarla kontrol altında tutuluyorsa,
- Verapamil ve diltiazem gibi negatif inotropik etkileri olan kalsiyum kanal blokerleri kullanıyorsanız
- Kronik bronşit, amfizem gibi bronşlarda spazm yaratan bir akciğer hastalığınız varsa,
- Size anestezi uygulanmasını gerektiren bir cerrahi operasyon geçirecekseniz,
- Sizde şeker hastalığı (diyabet) varsa,
- Tiroid bezinden aşırı hormon yapılmasına neden olan bir hastalığınız varsa,
- Kalp atım hızınızı arttıran ya da kalpteki iletimi bozan bir bozukluğunuz varsa (Wolf-Parkinson-White sendromu),
- Böbreklerinize ilgili ciddi bir bozukluğunuz varsa,
- Karaciğerinize ilgili ciddi bir bozukluğunuz varsa,
- Göz içi basıncınızda artışa yol açan (glokom) bir bozukluğunuz varsa,

DİDERAL'i dikkatli kullanınız.

### **Hipoglisemik nöbetler**

Çocuklarda DİDERAL tabletlerin kan şekerini düşürücü etkisi daha hızlı ortaya çıkabilir. Bu bazen hipoglisemik nöbetlere yol açabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **DİDERAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

Aç karnına alındığında kandaki miktarlarındaki en yüksek değere 1-4 saat içinde ulaşır. İlacı kullanırken alkol almaktan kaçınmalısınız.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Doktorunuz durumunuzu değerlendirerek hamilelik sırasında DİDERAL tedavisinden kaçınılıp kaçınılmayacağına karar vererek sizi bilgilendirecektir.

DİDERAL anne karnındaki bebeğe zarar verebilir. Bu nedenle, eğer doğurganlık çağında olan bir kadınsanız, tedaviniz sırasında etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Doktorunuz durumunuzu değerlendirerek emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da emzirme sırasında DİDERAL tedavisinden kaçınılıp kaçınılmayacağına karar vererek sizi bilgilendirecektir.

### **Araç ve makine kullanımı**

DİDERAL'in araç ve makine kullanma becerisi üstünde olumsuz bir etkisi yoktur. Ancak görme bozukluğu, sersemlik, yorgunluk oluşabileceğinden, araç veya makine kullanmadan önce bunlardan etkilenmediğinizden emin olunuz.

### **DİDERAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Bu tıbbi ürün Ponceau 4-R içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

### Kalp-damar sistemiyle ilgili ilaçlar

- Kalpte ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (Anti-aritmikler; örn. kinidin, amiodaron, disopiramid, lidokain)
- Yüksek tansiyonun tedavisinde kullanılan kalsiyum kanal blokörleri (diltiazem, verapamil, nisoldipin, nifedipin, nikardipin, isradipin, lasidipin)
- Kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan kardiyak glikozitler (digitalis)
- Kalp yetmezliği ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ADE inhibitörleri
- Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan klonidin ve moksonidin
- Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan alfa blokörler (prazosin, terazosin, doksazosin)
- Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan reserpin
- Kalp fonksiyonlarını desteklemek için kullanılan inotropik ajanlar (epinefrin)
- Astım tedavisinde kullanılan isoproterenol ve kalp yetersizliğinde kullanılan dobutamin

### Kalp damar sistemi dışındaki ilaçlar

- Steroidal yapıda olmayan ağrı, ateş ve iltihaba etkili (anti-inflamatuvar) ilaçlar (ibuprofen, indometazin, rifampisin)
- Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (MAO inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlar)
- Anestezi ajanları (metoksifluran, trikloretilen)
- Migren ilaçları (Zolmitriptan, rizatriptan, ergotamin türevleri)
- Astım ve kronik tıkalı akciğer hastalıklarında kullanılan teofilin
- Merkezi sinir sistemi fonksiyonlarını yavaşlatan, sakinleştirici, uyku verici, kaygı giderici, kasılma nöbetlerini giderici, kas gevşetici olarak kullanılan benzodiazepin grubu ilaçlar (diazepam, oksazepam, triazolam, lorazepam, alprazolam)
- Psikoz adı verilen gerçeği değerlendirme fonksiyonunu bozan ciddi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (Nöroleptikler: haloperidol, tioridazin, klorpromazin)
- Düzensiz kalp atışı (aritmi) tedavisinde veya lokal anestezide kullanılan ilaçlar (lidokain, propafenon veya flekainid)
- Mide bağırsak sisteminde oluşan yaraların tedavisinde kullanılan anti-ülser ilaçları (simetidin, alüminyum hidroksit jeli, metoklopramid)
- Lipid düşürücü ilaçlar (Kolestiramin, kolestipol, lovastatin, pravastatin, fluvastatin)
- Diyabet tedavisinde kullanılan insülin içeren ilaçlar
- Kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan varfarin
- Sentetik tiroid hormonu olan, tiroksin
- Alkol (etanol)
- Sigara
- Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan hidralazin
- Rifampin (verem ve diğer bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotik)
- Sara hastalığı tedavisinde kullanılan fenitoin ve fenobarbital
- Anestetik alacaksanız ya da kan veya idrar testi yaptırarsanız, doktorunuza veya dış hekiminize propranolol aldığınızı hatırlatınız.

Klonidin (hipertansiyon için) ve DİDERAL'i birlikte kullanıyorsanız, doktorunuz söylemedikçe klonidin almayı bırakmamalısınız. Klonidin almayı bırakmanız gerekirse, doktorunuz size nasıl yapılacağı konusunda dikkatli talimatlar verecektir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### 3. DİDERAL nasıl kullanılır?

#### Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler:

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) durumunda:

Başlangıç dozu günde iki kere 80 mg (2 tablet DİDERAL) olup bir haftalık aralarla doz, hastadan alınan cevaba göre artırılabilir.

Normal doz günde 160-320 mg'dır (4-8 tablet DİDERAL).

DİDERAL ile birlikte bir diüretik (idrar söktürücü) veya başka bir antihipertansif (tansiyon düşürücü ilaç) kullanılarak kan basıncının biraz daha düşmesi sağlanır.

Göğüs ağrısı, kaygı durumu, migren, nedeni belirsiz titreme durumunda:

Başlangıç dozu olarak günde 2 veya 3 defa 40 mg (1 tablet DİDERAL) verilir ve hastadan alınan cevaba göre bir haftalık aralarla aynı miktarda artırılır.

Kaygı durumu, migren, nedeni belirsiz titremede günde 80-160 mg (2-4 tablet DİDERAL) ve göğüs ağrısında (anginada) günde 120-240 mg (3-6 tablet DİDERAL) dozlarla istenilen cevap alınır.

Kalp ritim bozuklukları, kaygıdan kaynaklı kalbin hızlı atışı, kalp kasının aşırı kalınlaşarak tıkaçıcı bir hal almasına neden olan hastalık ve tiroid hormonlarının aşırı salgılanmasına bağlı kriz durumunun tedavisinde:

Günde 3 veya 4 kere 10-40 mg'lık (1/4-1 tablet DİDERAL) dozlarla istenilen netice alınır.

Kalp krizi sonrasında:

Tedaviye, miyokard infarktüsü sonrasında 5 ile 21. günler arasında başlanmalıdır. Başlangıç dozu 2-3 gün süreyle, günde 4 kere 40 mg (1 tablet) olmalıdır. Bundan sonra hastanın preparatı uygun şekilde almasını sağlamak için günlük toplam doz günde iki kere 80 mg (2 tablet DİDERAL) olarak verilebilir.

Böbrek üstü bezinde oluşan bir tümörün yol açtığı, epinefrin/norepinefrin gibi maddelerin aşırı salgılandığı bir hastalığın (Feokromositoma) tedavisinde:

(Sadece alfa-blokör bir preparatla birlikte kullanılır).

Cerrahi müdahale öncesi: Üç gün süreyle günde 60 mg

Müdahale edilemeyen malign vakalarda: günde 30 mg.

#### Uygulama yolu ve metodu:

DİDERAL ağızdan alınır. Bir bardak suyla tabletinizi çiğnmeden yutunuz.

#### Değişik yaş grupları:

##### Çocuklarda kullanımı:

Kalp ritim bozuklukları, böbrek üstü bezi tümörüne bağlı yüksek tansiyon (feokromositoma) ve tiroid hormonlarının aşırı salgılanmasına bağlı kriz durumu:

Dozaj hastaya göre düzenlenmelidir. Aşağıdaki dozaj sadece genel bir fikir vermek amacıyla:

İhtiyaca göre günde üç veya dört defa 0,25-0,5 mg/kg (örneğin 30 kg ağırlığındaki bir çocukta günde 3-4 defa 7,5 – 15 mg)

### Migren:

12 yařın altında: Günde iki veya üç defa 20 mg (1/2 tablet).

12 yařın üzerinde: Yetiřkin dozu verilir.

### **Yařlılarda kullanımı:**

DİDERAL yařlılarda dikkatli kullanılmalı, 65 yařın üzerindeki yařlı hastalarda doz seęimi dikkatli yapılmalıdır. Karacięer bbrek ya da kalp iřlevinin azalmıř olması ve birlikte bařka hastalıkların bulunması ya da bařka ilaę tedavilerinin de uygulanıyor olması durumunda doktorunuz size zel doz ayarlaması yapacaktır, gerekirse tedaviye dřk doz ile bařlayacaktır ve alınacak klinik cevaba gre dozu ayarlayacaktır.

### **zel kullanım durumları:**

#### **Bbrek/Karacięer yetmezlięi:**

Karacięer, bbrek ya da kalp iřlevlerinin azalmıř olması ve birlikte bařka hastalıkların bulunması ya da bařka ilaę tedavilerinin de uygulanıyor olması durumunda doktorunuz size zel doz ayarlaması yapacaktır, gerekirse tedaviye dřk doz ile bařlayacaktır ve alınacak klinik cevaba gre dozu ayarlayacaktır.

*Eęer DİDERAL'in etkisinin ok gçl veya zayıf olduęuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuřunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla DİDERAL kullandıysanız:**

*DİDERAL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmıřsanız bir doktor veya eczacı ile konuřunuz.*

Ařırı doz alınması durumunda tansiyon dřmesi, kalp atım sayısının azalması, kalp yetmezlięi, solunum gçlę veya kan řekeri dřklęne baęlı nbetler grlebilir.

### **DİDERAL'i kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek iin ift doz almayınız.*

### **DİDERAL ile tedavi sonlandırıldıęındaki oluřabilecek etkiler:**

Doktorunuza danıřmadan DİDERAL tedavinizi sonlandırmayınız veya tedaviye ara vermeyiniz. DİDERAL tedavisinin ani olarak kesilmesini takiben gęs aęrısında (anjina) alevlenme ve kalp krizi bildirilmiřtir. DİDERAL kesileceęi zaman doz en az birkaç hafta iinde kademeli olarak doktorunuz tarafından ayarlanarak azaltılacaktır.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tm ilalar gibi, DİDERAL'in ierięinde bulunan maddelere duyarlı olan kiřilerde yan etkiler olabilir.

**Ařaęıdakilerden biri olursa, DİDERAL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil blmne bařvurunuz:**

- Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudaklarda şişme veya nefes almada ve yutmada zorluğa neden olan boğaz şişmesi, ciltte kaşınma ve kızarıklıklar ile ortaya çıkan ciddi alerjik reaksiyon
  - Ciltte yaygın olarak meydana gelen pullanmayla kendini gösteren bir hastalık (sistemik lupus eritemozus)
  - Kalp atım sayısının aşırı düşmesi ve aşırı tansiyon düşüklüğü ile baygınlık
  - Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)
  - Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
- Bunların hepsi çok ciddi yan etkilidir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DİDERAL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- **İlaça tahammülsüzlük:** Baş dönmesi, sersemlik, bayılma veya bulanık görmeye neden olan yavaş kalp atım hızı veya düşük kan basıncı
- **Alerjik reaksiyon:** Kaşıntı, nefes darlığı veya yüz, dudaklar, boğaz veya dilde şişlik

Bunların hepsi ciddi yan etkilidir. Acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

**Yaygın:**

- Yorgunluk, uzuvlarda soğukluk, uyuma güçlüğü (bu belirtiler genellikle geçicidir)
- Yavaş veya düzensiz kalp atışı, Raynaud sendromu (el ve ayak parmaklarındaki kılcal damarlarda dolaşım bozukluğu)
- Kabuslar

**Yaygın olmayan:**

- Bulantı, kusma veya ishal (bu belirtiler genellikle geçicidir)

**Seyrek (1000 hastadan 1'inde görülen):**

- Trombositopeniye (kan pulcuklarında azalma) bağlı deride çürük, burun kanamaları
- Kalp yetmezliğinin kötüleşmesi, düşük kan basıncı/ayağa kalkarken baygınlık, intermitan klodikasyonun (yetersiz kan dolaşımından ötürü yürürken bacaklarda ağrı hissedilmesi) kötüleşmesi, kalp ritim bozukluğunda kötüleşme
- Deri döküntüsü, sedef hastalığının kötüleşmesi, sedef benzeri deri reaksiyonları, saç dökülmesi, deri altında kanamaya bağlı küçük morluklar (purpura)
- Halüsinasyonlar, duygusal değişiklikler, karıncalanma, psikozlar, hafıza kaybı, baş dönmesi
- Astımı veya solunum problemleri öyküsü olan hastalar nefes darlığı yaşayabilir.

- Gözlerde kuruluk, görme bozuklukları

#### **Çok seyrek:**

- Kas güçsüzlüğü ile seyreden miyastenia gravis benzeri belirtiler ya da miyastenia gravis alevlenmesi

#### **Sıklığı bilinmiyor:**

- Hipertiroidizm belirtileri gizlenebilir.
- Kan yağlarında değişiklikler
- Kan şekeri düzeylerinde değişiklikler (Yenidoğanlar, bebekler, çocuklar, yaşlı hastalar, hemodiyalize giren hastalar, birlikte şeker hastalığı ilacı kullanan hastalar, uzun süre aç kalan hastalar ve kronik karaciğer hastalığı olan hastalarda kan şekerinde düşme)
- Düşük kan şekeri düzeylerine bağlı nöbetler
- Kalp damarlarında daralmaya bağlı gelişen göğüs ağrısında (angina) kötüleşme, baş ağrısı, depresyon (ruhsal çökkünlük), zihin bulanıklığı (konfüzyon)
- Kabızlık, ağız kuruluğu
- Cinsel dürtü veya iktidarda değişiklikler
- Eklem ağrısı
- Gözde iltihaplanma (konjunktivit)
- Nefes darlığı (dispne)
- Böbrek kan akımında ve böbreğin süzme gücünde (GFR) azalma
- Kanda enfeksiyonla mücadele eden beyaz kan hücrelerinde ani düşüş (agranülositoz)
- Aşırı terleme (hiperhidroz)

Bunlar DİDERAL'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. DİDERAL'in saklanması**

*DİDERAL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

DİDERAL'i 25°C altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DİDERAL'i kullanmayınız.*

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu ilala ilgili ayrıntılı ve gncel bilgilere, akıllı telefon/tablet veya bir karekod okuyucu ile karekodu tarayarak ulařabilirsiniz.

***Ruhsat sahibi:*** BMED İla Danıřmanlık Saėlık rn ve Hizmetleri Tic. Ltd. řti.  
Yenimahalle / Ankara  
Tel: (0312) 248 14 41  
Faks: (0312) 248 13 03

***retim yeri:***  
Sanofi İla San. ve Tic. A.ř.  
Bykkarıřtıran 39780, Lleburgaz-Kırklareli

*Bu kullanma talimatı ..../.... tarihinde onaylanmıřtır.*